



KÉTAMINE

*Anesthésiant
Hallucinogène*



LES EFFETS RECHERCHÉS

ÉTAT D'EUPHORIE
BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
EFFETS DISSOCIATIFS

PERTE DE LA NOTION DU TEMPS,
DE L'ESPACE ET DE MA SENSIBILITÉ CORPORELLE.



LES DIFFÉRENTES FORMES

POUDRE POUVANT ÊTRE SNIFFÉE
OU
LIQUIDE BUVABLE OU INJECTABLE

LA DURÉE



MONTÉE (+/- 10 MIN) ET DURÉE DES EFFETS (2H MAX).



LES DIFFÉRENTS RISQUES

RISQUES DE CHUTES OU DE BLESSURES.

RISQUES DE VOMISSEMENTS SI JE DÉCIDE DE MANGER PENDANT OU DE BOIRE DE L'ALCOOL.

SI JE MÉLANGE AVEC D'AUTRES PRODUITS = RÉELLE AUGMENTATION DES RISQUES CARDIO-VASCULAIRES.

K-HOLE POSSIBLE (SORTE DE TROU NOIR AVEC DÉLIRES HALLUCINATOIRES, PERTE D'IDENTITÉ ET DE CONTACT À LA RÉALITÉ), IL M'EST IMPOSSIBLE DE BOUGER !



QUE FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES ?

J'UTILISE DES PAILLES À USAGE UNIQUE.

JE MANGE AVANT ET APRÈS LES PRISES.


SI JE ME SENS "PARTIR EN HOLE" J'AVERTIS MES AMI.ES, JE RESTE AVEC EUX ET JE M'ALLONGE SUR LE CÔTÉ.

JE NE BOIS PAS/PLUS D'ALCOOL !



POUR PLUS D'INFORMATIONS

TU T'INTERROGES ?
TU T'INQUIÈTES ?
NOUS POUVONS T'APPORTER DES
REPNSES TRANQUILLEMENT.



www.ceid-addiction.com

