



# PROTOXYDE D'AZOTE



## LES EFFETS RECHERCHÉS



*Anesthésiant  
Hallucinogène*

EUPHORISANTS  
RIRES INCONTRÔLABLES, UNE SENSATION D'ÉBRIÉTÉ.  
DISTORSIONS AUDIOVISUELLES ET GAIN D'ÉNERGIE.



## LA DURÉE

C'EST TRÈS RAPIDE : LA MONTÉE COMME LA DESCENTE  
SE PASSENT EN QUELQUES SECONDES !

SI J'EN REPRENDS POUR FAIRE DURER LES EFFETS,  
J'AUGMENTE LES RISQUES !



## LES DIFFÉRENTS RISQUES



AU MOMENT DE CONSOMMER:

GAZ TRÈS FROID = BRÛLURES.  
PERTE DE RÉFLEXE DE LA TOUX ET DE LA DÉGLUTITION =  
FAUSSES ROUTES.

MAUX DE TÊTE, CONFUSION ET VERTIGE  
PAR MANQUE D'OXYGÈNE, JE PEUX PERDRE CONNAISSANCE  
ET CHUTER.

EN CAS DE CONSOMMATION PROLONGÉE:

RISQUES NEUROLOGIQUES GRAVES, TROUBLES  
PSYCHIQUES ET CARDIAQUES + RISQUES ADDICTIFS.



## QUE FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES ?

JE TRANSFÈRE VERS UN BALLON PAR UN "CRACKER" ET J'ATTENDS QUE LE GAZ SE RÉCHAUFFE.

JE PENSE À RESPIRER HORS DU BALLON ENTRE CHAQUE INHALATION ET N'ABUSE PAS DU PROTO SUR LA MÊME SOIRÉE

SI J'AI DES PROBLÈMES CARDIO-RESPIRATOIRES OU NEUROLOGIQUES, J'ÉVITE D'EN CONSOMMER.

JE CONSOMME ASSIS.E MAIS SURTOUT PAS AU VOLANT.

JE N'UTILISE PAS DE MASQUE OU DE SAC PLASTIQUE COUVRANT NEZ ET BOUCHE.

SI DES FOURMILLEMENTS/ENGOURDISSEMENTS APPARAISSENT (DOIGTS ET ORTEILS), JE STOPPE MA CONSO ET CONSULTE UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ RAPIDEMENT.

JE CHOISIS LES CARTOUCHES ALIMENTAIRES OU MÉDICALES, SURTOUT PAS À USAGE MÉNAGER (AIR SEC).



## POUR PLUS D'INFORMATIONS

TU T'INTERROGES ?  
TU T'INQUIÈTES ?  
NOUS POUVONS T'APPORTER DES  
REPONSES TRANQUILLEMENT.

